УДК 537.9

СУЖЕНИЕ ЛИНИИ ЯМР В СИСТЕМАХ С ВНУТРЕННЕЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ПОДВИЖНОСТЬЮ

Рябушкин Д. С.

*Физико-технический институт, Крымский федеральный университет имени
В. И. Вернадского, Симферополь 295007, Россия
E-mail: druabushkin@cfuv.ru*

Рассмотрены возможности сужения линии ядерного магнитного резонанса (ЯМР) в твердых телах с диполь-дипольным взаимодействием ядер при наличии стохастических процессов. В качестве модели выбран гаусс-марковский процесс. Показано, что использование импульсных последовательностей WHH-4 и MREV-8 позволяет эффективно сужать сигнал в системах с малой и высокой интенсивностью внутренних движений. В области медленных движений возможности данных серий ограничены.

Ключевые слова: ядерный магнитный резонанс, линия поглощения, сужающие последовательности, спад свободной прецессии, моменты линии ЯМР.

PACS: 74.25.nj

ВВЕДЕНИЕ

Спектры ЯМР, в принципе, отражают все взаимодействия, присутствующие в образце. Но, как правило, эти взаимодействия различны по своей интенсивности и потому огибающая спектра соответствует наиболее сильному из них (как правило, диполь-дипольному), в то время как детали слабых взаимодействий скрыты от исследователя. В настоящее время существует ряд методик, позволяющих нейтрализовать диполь-дипольные взаимодействия в твердых телах. К наиболее популярным из них относятся многоимпульсные серии WHH-4 и MREV-8 [1–8]. Обычно при анализе данных последовательностей считается, что решетка является жесткой. Между тем, вопрос о влиянии внутренней молекулярной подвижности в твердых телах на эффективность сужения линии ЯМР возникает, как минимум, по двум причинам. Во-первых, подвижность приводит к сужению линии ЯМР, ибо при наличии случайных процессов локальные поля подвергаются усреднению. Во-вторых, внутренняя подвижность плохо сказывается на согласованном движении магнитных моментов ядер под действием импульсов. Таким образом, представляет интерес вопрос о том, какая из этих двух тенденций является определяющей и есть ли здесь какая-либо зависимость от интенсивности внутренних молекулярных движений.

В настоящей работе вычислены сигналы спада свободной прецессии (ССП) в многочастичных системах при наличии в них стохастического процесса гаусс-марковского типа. Проанализирован вопрос о применимости сужающих серий к системам с различной интенсивностью внутренних движений.

ССП В СЕРИЯХ WHH-4 И MREV-8

Рассмотрим гомоядерную систему, содержащую ядра со спином, отличным от нуля. В этом случае гамильтониан диполь-дипольного взаимодействия в приближении сильного поля имеет вид

$$H = \frac{1}{2} \sum_{i,j} D_{zz}^{ij} (2I_{iz}I_{jz} - I_{ix}I_{jx} - I_{iy}I_{jy}), \quad (1)$$

где D_{zz}^{ij} есть zz -компонента тензора диполь-дипольного взаимодействия [2].

В равновесном состоянии при наличии сильного постоянного магнитного поля, направленного вдоль оси z , оператор матрицы плотности имеет вид

$$\bar{\rho}(0) = I_z. \quad (2)$$

С помощью подготовительного импульса, не входящего в состав сужающих серий, преобразуем (2) в

$$\bar{\rho}(0) = I_y. \quad (3)$$

Подвергнем спиновую систему воздействию серии WHH-4, т.е. совокупности резонансных 90-градусных импульсов $90^\circ_x - 2\tau - 90^\circ_x - \tau - 90^\circ_y - 2\tau - 90^\circ_y - \tau$.

Наблюдение ведется в момент времени 6τ . Будем считать, что каждому импульсу соответствует оператор поворота, влиянием спин-спиновой релаксации в течение действия каждого импульса пренебрегаем.

В интервалах между импульсами оператор матрицы плотности развивается под действием гамильтониана внутренних взаимодействий в соответствии с уравнением Лиувилля

$$\dot{\rho} = i[\rho, H]. \quad (4)$$

Таким образом, в момент времени 0^+ (сразу после первого импульса серии) оператор ρ примет вид

$$\rho(0)^+ = e^{-i\frac{\pi}{2}I_x} I_y e^{i\frac{\pi}{2}I_x}. \quad (5)$$

В момент времени $2\tau^-$ (непосредственно перед вторым импульсом) оператор матрицы плотности превратится в

$$\bar{\rho}(2\tau) = e^{-i\int_0^{2\tau} H(t')dt'} e^{-i\frac{\pi}{2}I_x} I_y e^{i\frac{\pi}{2}I_x} e^{-i\int_0^{2\tau} H(t')dt'}. \quad (6)$$

Продолжая так и далее, получим оператор матрицы плотности в момент

времени 6τ и используем его для вычисления сигнала по общей формуле

$$G(t) = \text{Tr}(\rho(t)I_y) / \text{Tr}(I_y^2). \quad (7)$$

Для вычисления следа в (7) воспользуемся полным набором собственных функций гамильтониана (1). Кроме того, примем в качестве модели гаусс-марковский процесс, для которого

$$\langle \omega(t')\omega(t'') \rangle = \bar{M}_2 + \Delta M_2 e^{-\frac{|t'-t''|}{\tau_c}}, \quad (8)$$

где $\bar{M}_2$ – второй момент линии поглощения в быстроподвижной системе, ΔM_2 – разность вторых моментов линий в жесткой и быстроподвижной системах, τ_c – время корреляции, то есть среднее время жизни системы в заданной решеточной конфигурации [9].

Окончательно находим:

$$G(6\tau) = \exp \left[-\Delta M_2 \tau_c^2 \left(4 \frac{\tau}{\tau_c} - 5 + 4e^{-\frac{\tau}{\tau_c}} + 4e^{-\frac{2\tau}{\tau_c}} - 4e^{-\frac{3\tau}{\tau_c}} + e^{-\frac{4\tau}{\tau_c}} \right) \right] \quad (9)$$

На рис. 1 представлена зависимость сигнала в момент времени 6τ от τ/τ_c при значениях параметра $\Delta M_2 \tau_c^2 = 0,5$; 1; 2 (сверху вниз). Как видно, данная зависимость имеет типичный для импульсных экспериментов характер, отражающий спад сигнала при нагревании образца и его восстановление при высоких температурах.

Рис. 1. Зависимость сигнала в момент времени 6τ от безразмерной величины τ/τ_c при значениях параметра $\Delta M_2 \tau_c^2 = 0,5$ (кривая 1), 1 (кривая 2), 2 (кривая 3)

Для выяснения вопроса о возможности сужения линии ЯМР при наличии стохастических процессов было проведено сравнение полученного выражения с обычным спадом свободной прецессии, регистрируемым после одного 90-градусного импульса:

$$G(t) = \exp \left[-\frac{1}{2} \bar{M}_2 t^2 - \Delta M_2 \tau_c^2 \left(\frac{t}{\tau_c} + e^{-\frac{t}{\tau_c}} - 1 \right) \right]. \quad (10)$$

Сравнение (9) и (10) показывает, что член с $\bar{M}_2$ отсутствует в первой из этих формул. Между тем даже при выполнении условия $\bar{M}_2 \ll M_2$ его присутствие играет важную роль при интенсивных тепловых движениях. На рис. 2 представлены ССП, построенные по формуле (9) (сплошная линия), и по формуле (10) (прерывистая линия).

Рис. 2. Спад свободной прецессии и отклик системы на серию WHH-4 в жесткой (а) и быстроподвижной (б) системах, а также при температурах, относящихся к переходной области (в)

При этом в (9) принималось, что $t = 6\tau$. Отношение второго момента суженной движением линии ко второму моменту линии жесткой системы равнялось достаточно характерному значению 10. В качестве безразмерного параметра выбиралась величина $M_2\tau_c^2$, в качестве безразмерной переменной – $M_2^{1/2}t$. Случай (а) соответствует жесткой системе ($M_2\tau_c^2 = 100$), при этом спад сужающей серии затухает намного медленнее обычного ССП. Данное обстоятельство указывает на сужение линии поглощения. Аналогичная картина наблюдается и для быстроподвижной системы ($M_2\tau_c^2 = 0,001$), см. случай (б). Что касается переходной области, соответствующей медленным движениям ($\Delta M_2\tau_c^2 = 0,5$), случай (в), то здесь различие сигналов минимально.

Расчет, выполненный для серии MREV-8, дает довольно громоздкий по сравнению с (9) результат, который обладает теми же временными и температурными особенностями, что и отклик на действие серии WHH-4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе рассмотрен вопрос о возможности сужения линии поглощения ЯМР в системах с доминированием диполь-дипольного взаимодействия при наличии внутренней молекулярной подвижности. Показано, что серии WHH-4 и MREV-8 позволяют частично нейтрализовать влияние диполь-дипольного взаимодействия в близких к жестким и быстроподвижным системам. В области медленных движений (т.е. в переходной области) эффективность данных последовательностей минимальна, что говорит о значительном влиянии стохастических эффектов при формировании откликов на сужающие серии.

Список литературы

1. Haeberlen U. High resolution NMR in solids: selective averaging. N. Y. : Academic Press, 1976. 204 p.
 2. Mehring M. Principles of High Resolution NMR in solids. Berlin : Springer Verlag, 1976. 344 p.
 3. Хеберлен У., Меринг М. ЯМР высокого разрешения в твердых телах. М. : Мир, 1980. 504 с.
 4. Уо Дж. Новые методы ЯМР в твердых телах. М. : Мир, 1978, 178 с.
 5. Сергеев Н. А., Рябушкин Д. С. Основы квантовой теории ядерного магнитного резонанса. М. : Логос, 2013. 272 с.
 6. Сликтер Ч. Основы теории магнитного резонанса. М. : Мир, 1981. 448 с.
 7. Waugh J. S., Huber L. M., Haeberlen U. Approach to High-Resolution NMR in Solids // Phys. Rev. 1968. Vol. 20. Num. 5. Pp. 180–182.
 8. Rhim W.-K., Elleman D. D., Vaughan R. W. Enhanced resolution for solid state NMR // J. Chem. Phys. 1973. Vol. 58. Pp. 1772–1773.
 9. Lowe I. J. Motionally Narrowed NMR Line Shapes in Solids // Proceedings of the IV AMPERE International Summer School, Pula, 1977, P. 343.
-

NMR LINE NARROWING IN SYSTEMS WITH INTERIOR MOLECULAR
MOBILITY

Ryabushkin D. S.

*Institute of Physics and Technology, V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol 295007, Russia**E-mail: druabushkin@cfuv.ru*

The possibilities of narrowing the nuclear magnetic resonance (NMR) line in solids with dipole-dipole interaction of nuclei in the presence of stochastic processes are considered. The Gauss-Markov process is chosen as the model. It is shown that the use of pulse sequences WHH-4 and MREV-8 allows to narrow the signal effectively in the rigid and fast-moving systems. In the area of slow motions the capabilities of these series are limited.

Keywords: nuclear magnetic resonance, absorption line, narrowing sequences, free precession decay, moments of the NMR line.

References

1. U. Haeberlen, *High resolution NMR in solids: selective averaging* (Academic Press, N. Y., 1976).
2. M. Mehring, *Principles of High Resolution NMR in solids* (Springer Verlag, Berlin, 1976).
3. U. Haeberlen, M. Mehring, *YMR vyisokogo razresheniya v tverdyih telah [High resolution NMR in solids]* (Mir, Moscow, 1980) [in Russian].
4. J. Waugh, *Novyye metody YMR v tverdyih telah [New methods of NMR in solids]* (Mir, Moscow, 1978) [in Russian].
5. N. A. Sergeev, D. S. Ryabushkin, *Osnovyi kvantovoi teorii yadernogo magnitnogo rezonansa [Fundamentals of nuclear magnetic resonance quantum theory]* (Logos, Moscow, 2013) [in Russian].
6. C. Slichter, *Osnovyi teorii magnitnogo rezonansa [Principles of Magnetic Resonance]* (Mir, Moscow, 1981) [in Russian].
7. J. S. Waugh, L. M. Huber, U. Haeberlen, *Phys. Rev.* **20**, 180–182 (1968).
8. W.-K. Rhim., D. D. Elleman, R. W. Vaughan, *J. Chem. Phys.* **58**, 1772–1773 (1973).
9. I. J. Lowe, “Motionally Narrowed NMR Line Shapes in Solids” in *Proceedings of the IV AMPERE International Summer School*, Pula, 1977, P. 343.

*Поступила в редакцию 18.06.2017 г. Принята к публикации 26.11.2017 г.
Received June 06, 2017. Accepted for publication November 26, 2017*